기능성화장품

비젼 크림톤

빠른염색

방치시간 10분

사용설명서

지금까지 염모제로 인해 염증을 일으킨 적이 있는 분은 절대로 사용하지 마십시오.

⚠주 의

- 사용 시에는 반드시 마지막까지 잘 읽고 바르게 사용해 주세요.
- 염모제는 드물게 심한 알레르기 반응을 일으킬 수 있습니다.
- 사용 시에는 해당 반드시 피부 시험(패치 테스트)을 실시해 주세요.

효능 · 효과

모발의 염모

용법 · 용량

제1제 1g(㎖)에 대하여 제2제 1g(㎖)의 비율로 사용 직전에 잘 섞은 후 모발에 균등히 바릅니다. 10~20분 후에 미지근한 물로 잘 헹군 후 비누나 샴푸로 깨끗이 씻고 마지막에 따뜻한 물로 충분히 헹굽니다.
용량은 모발의 양에 따라 적절히 증감합니다.

사용량 기준
1 개 전체(2제, 염모 어려모발 전체) 약 1 회분입니다.
※머리 양이 많은 분은 2 개를 준비해 주세요.

[화장품책임판매업자] 동아제약
동아제약(주) 사업투명시 동대문구 청초대로 64
[화장품제조업자] hoyu Hoyu Co., Ltd.
효유(주) 501,五平7번1-2호, 하기사키시 일본
[문의전화] 080-920-2002(고객만족팀)
본 제품은 소비자보호에관한법률 제20조에 따라 교환 또는 보상합을 수 있습니다.
MADE IN JAPAN www.dpharm.co.kr
BGCS–22M005

상명서 작성일 : 2022.12

⚠주의 지금까지 염모제로 인해 염증이 생긴 적이 있는 분은 절대로 사용하지 마십시오.

염모제로 가려움, 발진, 발적 등이 생긴 경험이 있는 분은 절대 사용하지 마세요.
증상이 가벼워서 반복 사용하면, 오히려 알레르기 반응이 생길 위험이 있습니다.
사용시 피부나 가려움을 느끼거나, 심한 가려움을 느낀 경험이 있으면 절대 사용하지 마세요.

⚠사용할 때의 주의사항

1. 환자를 사용 시 또는 사용 후 직사광선에 의해와 사용부위가 붉은 반점, 부어오름 또는 가려움증 등의 이상 증상이나 부작용이 있는 경우 전문의 등과 상담할 것
2. 상처가 있는 부위 등에는 사용을 자제할 것
3. 보관 및 취급 시의 주의사항
   가. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
   나. 직사광선을 피해서 보관할 것
4. 눈에 접촉을 피하고 눈에 들어갔을 때는 즉시 씻어낼 것
5. 염모제(산화염모제와 비산화염모제)
   가) 다음증상은 사용하지 마십시오. 사용 후 피부나 신체가 과민상태로 되거나 피부이상반응(부종, 염증 등)이 일어나거나 한번에 충분히 약해질 가능성이 있습니다.
   (1) 지금까지 이 제품에 배합되어 있는 그룹(성분)의 원료로 알레르기 반응이 있었던 경우. 사용 중 또는 사용 직후에 구역, 구토 등 속이 좋지 않았던 분이나 평소 좋지 않았던 분이나 태양의 영향(햇볕)이 심하면
   (2) 지금까지 염모제를 사용할 때 피부이상반응(부종, 염증 등)이 있었거나 앞에 등 등의 염색 직후에 발진, 발적, 가려움 등이 있거나 구역, 구토 등 속이 좋지 않았던 경험이 있는 분
   (3) 피부나염(화학피부염, patch test의 경우, 이상이 일반한 경험이 있는 분
   (4) 피곤, 임질, 피임약에 하소증, 신부, 피부염이 있는 분
   (5) 생리 중, 임신 중 또는 임신할 가능성이 있는 분
   (6) 출산 후 병중, 병후의 회복 중인 분 : 그밖에 신체에 이상이 있는 분
   (7) 혈액질, 신장질환, 혈액질환이 있는 분
   (8) 수염, 속눈썹, 속구썹, 호흡곤란의 증상이 지속되거나 코피 등의 출혈이 있고 생리 그 밖에 출혈이 멈추기 어려운 증상이 있는 분
   (9) 이 제품에 함기재료 함유한 프로필렌글리콜에 의하여 일레르기를 일으킬 수 있으므로 이 성분에 과민하거나 일레르기 반응을 보였던 적이 있는 분은 사용 전에 이 제품 시험 패치 테스트를 반드시 실시하십시오.
   나) 염모제 사용전의 주의
   (1) 염색 전 2일전에서만 전체는 다음의 순서에 따라 제품 반드시 패치테스트(patch test)를 실시해야 주십시오.
   패치테스트는 반드시 부작용이 있는 제품인지 아닌지를 조사하는 테스트입니다. 시중에서 판매되고 있는 염모제 중에서 일부 사람이 있어 이상이 없어 사용하고 있는 분이라도 갑자기 부작용이 발생할 수 있으므로 제품 판도시 실시해 주십시오.
   (2) 지금까지 염모제를 사용할 때 피부이상반응(부종, 염증 등)이 있었거나 염색